

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy**

Oznaczenie arkusza: **MED.01-01-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **MED.01**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		<i>Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił</i>					
Rezultat 1: Stanowisko lekarza dentysty i asystentki przygotowane do pracy							
<i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.</i>							
<i>Egzaminator dokonuje oceny bezpośrednio przed oceną Przebiegu 2.</i>							
Na indywidualnym stanowisku pracy znajdują się:							
1	pojemnik na odpady medyczne zakaźne wyłożony czerwonym workiem, a na medyczne inne niż niebezpieczne - niebieskim workiem						
2	twardościenny pojemnik na odpady medyczne ostre						
3	środki ochrony indywidualnej dla lekarza: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica						
4	środki ochrony indywidualnej dla asystentki: rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa, okulary/przyłbica						
5	środki ochrony indywidualnej dla pacjenta: jednorazowy kubek, serweta ochronna, ochraniacz na zagłówek, wkład do spluwaczki, końcówka ślinociągu						
6	zestaw diagnostyczny na tacce metalowej: lusterko stomatologiczne, zgłębnik, pęseta stomatologiczna						
7	narzędzia: kleszcze Bertena do ekstrakcji górnych ósemek, dźwignia prosta Beina, łyżeczka zębodołowa prosta na tacce metalowej						
8	gazik do dezynfekcji ampułki, sterylne kompresy/tampony						
9	jałowe igły: do pobrania leku i do iniekcji, jednorazowa strzykawka typu Luer, ampułka ze środkiem znieczulającym						
10	zestaw do szycia zębodołu: nić chirurgiczna z igłą, imadło, nożyczki chirurgiczne						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Dokumentacja

Uwaga. Zapis może być uznany w innym brzmieniu pod warunkiem zgodności znaczeniowej i merytorycznej.

Wpisane:

1	<p>KARTA PORADNI CHOROBY CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ data: data egzaminu zęb: 28 zabiegi, zalecenia, skierowania, niezdolność do pracy, termin kontroli: ekstrakcja zęba w znieczuleniu środkiem 2% Lignocainum hydrochloricum cum noradrenalino, zaszyście rany poekstrakcyjnej/zębodołu, umówienie pacjenta na zdjęcie szwów za 7 dni</p>						
2	<p>ZALECENIA PO ZABIEGU EKSTRAKCJI ZĘBA: - tampon umieszczony przez chirurga trzeba przygryzać przez minimum pół godziny - nie należy nic jeść i pić przez dwie godziny po zabiegu - nie wolno spożywać żadnych gorących pokarmów / napojów - nie wolno palić / pić alkoholu - nie wolno płukać jamy ustnej w dniu zabiegu - należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego - w przypadku dolegliwości bólowych można zażyć lek przeciwbólowy - w razie niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem / gabinetem - po 7 dniach zgłosić się na usunięcie szwów <i>Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 3 zalecenia</i></p>						
3	<p>TERMIN NASTĘPNEJ WIZYTY data: 7 dni po dacie egzaminu godzina: wpisana przykładowa godzina cel wizyty: usunięcie szwów</p>						
4	<p>METRYCZKA NA WANIENKĘ ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM nazwa środka dezynfekcyjnego: Sekusept aktiv data i godzina sporządzenia środka: data egzaminu, wpisana przykładowa godzina czas ekspozycji: 15 minut</p>						
5	<p>METRYCZKA NA WANIENKĘ ZE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM ilość wody: 1500 ml ilość preparatu dezynfekcyjnego: 30 g stężenie: 2% podpis osoby sporządzającej roztwór: nr PESEL zdającego</p>						
6	<p>METRYCZKI NA POJEMNIKI Z ODPADAMI: MEDYCZNYMI ZAKAŻNYMI I INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE nazwa gabinetu dentystycznego: Gabinet chirurgii stomatologicznej REGON: 192771866 Nr księgi rejestrowej: 012345</p>						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Przygotowanie znieczulenia							
<i>Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki.</i>							
<i>Uwaga – zdający może mieć przygotowany lek znieczulający w zastępczej plastikowej ampulce</i>							
<i>Zdający:</i>							
1	wykonywał czynności ubrany w środki ochrony indywidualnej: maseczkę i okulary/przyłbicę, przed przystąpieniem do przygotowania znieczulenia umył i zdezynfekował ręce metodą Ayliffe’a, założył rękawiczki jednorazowe						
2	zdezynfekował ampułkę gazikiem nasączonym spirytusem i odłamał szyjkę ampułki						
3	wyjął strzykawkę jednorazową z opakowania, uwolnił igłę do pobrania znieczulenia z opakowania, a odsłoniętą jej nasadę połączył ze strzykawką						
4	jedną ręką trzymał ampułkę z lekiem, drugą strzykawkę z nałożoną igłą, następnie jednym ruchem włożył igłę do wnętrza ampułki, a igłą nie dotknął zewnętrznej ścianki ampułki						
5	po włożeniu igły do ampułki odciągnął tłok strzykawki i opróżnił ampułkę						
6	wyjął igłę z ampułki, metodą jednoręczną nałożył nasadkę na igłę do pobrania leku, odłożył strzykawkę na tackę; uwolnił z opakowania igłę 0,5x25 mm do znieczulenia nasiękowego, następnie połączył ją stabilnie ze strzykawką pozbawioną pierwszej igły						
7	trzymał pionowo strzykawkę igłą do góry, wysunął tłok, aż do usunięcia powietrza z kroplą płynu (leku) ze strzykawki						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis